

Specimens were exhibited, partly from the collection of the Rev. F. W. Hope, and partly from that of Mr. Westwood, of various *Hymenopterous Insects*, which Mr. Westwood regarded as new to science. They were accompanied by the following characters by Mr. Westwood :

Genus DIRHINUS, Dalm.

DIRHINUS MAURITIANUS. *Dir. æneo-niger*; capite thoraceque crassè punctatis, illius cornubus brevioribus obtusis; antennis nigris articulo 1mo ad basin et apicem piceo; tibiaram quatuor anticarum apicibus tarsisque omnibus testaceis; scutello in medio læviusculo; metathorace longitudinaliter 4-costato et utrinque angulato; abdomine nigro nitido, subtùs (♀) fornicato.

Long. corp. lin. 2. Exp. alar. lin. 3.

Hab. in Insulâ Mauritii, Dom. Templeton.

Genus METAPELMA, Westw. (Fam. Chalcididæ.)

Thorax ante alas elongatus, declivis.

Antennæ graciles, fere thoracis longitudine, apicem versus paullo crassiores, apice ipso obliquè truncato.

Abdomen compressum, oviductu exserto, abdominis longitudine.

Pedes intermedii longiores, femoribus paullo retrò-curvatis, tibiis calcari longo instructis, tarsis vix dilatatis subtùs ciliatis, articulo 1mo longiore: postici crassiores, tibiis tarsorumque basi valdè dilatatis compressis.

OBS. Genus *Eupelmo* affine.

METAPELMA SPECTABILIS. *Met. capite thoraceque viridibus cupreo nitentibus; antennis nigris; abdomine nigro, chalybeo purpureoque nitente; pedibus quatuor anticis ferrugineis viridi subnitentibus; tarsis intermediis fuscis ad basin albidis; pedibus duobus posticis fuscis, femoribus basi rufis, tibiis basi albis; oviductu nigro; alis pone medium nubeculâ vix infumatis.*

Long. corp. lin. 2½; oviductûs, lin. 1. Exp. alar. lin. 3¾.

Hab. in Georgiâ Americæ.—In Mus. Brit.

Genus SCHIZASPIDIA, Westw. (Fam. Chalcididæ.)

Corpus breve, crassum.

Antennæ breves, crassæ, 13-articulatæ, articulis 2do et 3tio fere æqualibus, 4to-10mum internè serratis, reliquis tribus in unum coalitis.

Scutellum magnum, posticè supra abdomen productum et ejus dimidium basale superans, ad apicem furcatum.

Abdomen thorace paullo majus, suprâ planum, pedunculo (fere tertiam partem abdominis longitudine æquante) ad thoracem affixum.

OBS. *Perilampum* (habitu) cum *Eucharide* (scutello armato) conjungens.

SCHIZASPIDIA FURCIFER. *Schiz. ænea; thoracis parte anticâ transversim striatâ; scutelli lateribus longitudinaliter sulcatis; abdo-*

minis dimidio basali cæruleo, apicali fulvo; antennis pedibusque fulvescentibus; alis maculâ substigmatali fuscescente.

Long. corp. lin. $2\frac{3}{4}$. Exp. alar. lin. $4\frac{1}{2}$.

Hab. apud Bengaliâ.—In Mus. Brit.

Variat magnitudine minore; antennis profundius serratis; thorace magis sulcato; abdomine toto fulvo. (An sexus alter? ♂?)

Genus PENTACLADIA, *Westw.* (Fam. Chalcididæ.)

Eulopho affinis: differt antennis 9-articulatis, articulo 2do parvo, 3tio-7mo ramum longum emittentibus, 8vo 9noque majoribus oblongo-ovalibus; abdomine compresso.

PENTACLADIA ELEGANS. *Pent. splendide purpureo-cærulescens, antennis obscurioribus.*

Eulopho ramicorni dimidio longior.

Hab. ?—In Mus. Com. Dejean (olim Latreillii).

Genus CHALCITELLA, *Westw.* (Fam. Chalcididæ.)

Antennæ ad os insertæ, 12?-13?-articulatæ, articulo 2do brevi, 3tio et sex sequentibus paullo majoribus, valdè continuis, reliquis tribus vel quatuor massam elongato-conicam efformantibus.

Metathorax valdè declivis.

Pedunculus dimidium abdominis longitudine æquans, gracilis, cylindricus.

Femora intermedia ad basin gracilia, ad apicem subclavata; coxæ posticæ crassæ, longæ; femora postica maxima, subtus 7-dentata.

Obs. Genus *Chalcidibus* typicalibus (ex. gr. *Sispes*) affine.

CHALCITELLA EVANIOIDES. *Chalc. nigra, punctata; abdomine compresso, nitido; antennarum basi, geniculis et interdum pedunculo piceis; tibiis tarsisque magis testaceis.*

Long. corp. lin. $1\frac{1}{4}$. Exp. alar. lin. 2.

Hab. in Insulâ Mauritiî, Dom. Templeton.

Genus MACROTELEIA, *Westw.* (Fam. Proctotrupidæ.)

Corpus longissimum, lineare.

Caput rotundatum, thoracis latitudine.

Antennæ in utroque sexu thoracis longitudine, 12-articulatæ, ♂ articulis fere æqualibus, submoniliformibus, ♀ articulis sex terminalibus clavam crassam oblongam efformantibus.

Thorax ovatus: scutello inermi.

Alæ abdomine multo breviores, nervis ut in genere *Pteromalo* dispositis.

Abdomen fere sessile, longissimum, longitudinaliter striatum, seg-

mentis quatuor basalibus æqualibus, depressum, marginatum ;
in ♀ longius et posticè valdè attenuatum : oviductu retracto.
Obs. Genus *Teleadi* affine.

MACROTELEIA CLEONYMOIDES. *Macr. nigra* ; abdomine piceo ;
antennarum basi pedibusque rufescentibus ; (♂) : ♀ picea ; capite
antennarumque clavâ nigris ; abdomine testaceo, apice nigro.

Long. corp. ♂ lin. $1\frac{7}{8}$, ♀ $2\frac{3}{8}$. Exp. alar. lin. $2\frac{1}{2}$.

Hab. in Insulâ Mauritii, Dom. Templeton.

Genus ANODONTYRA, Westw. (Fam. Scoliidæ.)

Corpus elongatum : abdomen, articulis continuis, oblongo-ovatum,
ad apicem inerme.

Antennæ graciles, 13-articulatæ, articulo 2ndo discreto, ♂.

Mandibulæ dente valido interno ante apicem armatæ.

Palpi maxillares elongati, 6-, labiales 4-articulati.

Alarum nervi fere ut in *Tengyra Sanvitali* dispositi.

Obs. *Tengyris* affinis : statura minus elongata quam in *Tengyris*
et *Myzinibus* ♂.

ANODONTYRA TRICOLOR. *An. nigra* ; collari anticè flavo lineato ;
segmentis abdominalibus 2do, 3tio et 4to ad marginem posticum
flavo interruptè marginatis, subtùs etiam maculâ parvâ laterali
ejusdem coloris notatis ; tibiis tarsisque testaceis ; alis fulvo-
testaceis, ante apicem nubilo fusciscenti notatis.

Long. corp. lin. $8\frac{1}{4}$. Exp. alar. lin. $14\frac{1}{2}$.

Hab. in Chili.—In Mus. Dom. Hope.

Genus SERICOGASTER, Westw. (Fam. Vespidæ?)

Caput magnum, planum, quadratum : oculi integri, ovales.

Antennæ (♀) capite non longiores, in medio faciei insertæ, genicu-
latæ, 12-articulatæ, articulo 1mo longo, reliquis valdè continuis.

Labrum corneum, triangulare.

Mandibulæ mediocres, ante medium et sub apicem internè excisæ.

Maxillæ et Mentum elongatæ : palpi maxillares 6-, labiales (bre-
viores) 4-articulati.

Labrum e lobis duobus parvis carnosis constans.

Thorax brevis : scutello haud elevato.

Abdomen ovale, subdepressum, segmentis continuis.

Pedes breves, antici (♀) haud fossorii, tibiis posticis spinosis.

Alæ anticæ cellulâ 1 marginali subappendiculatâ, cellulis 2 sub-
marginalibus completis quarum 2dâ nervos duos recurrentes
recipit.

Obs. Genus quoad affinitates dubium. *Ceramium* (habitu) *Philan-
this* vel potius *Sapygis* (structurâ orali) quasi conjungens.

SERICOGASTER FASCIATUS. *Ser. niger*; scutello, antennis, pedibusque rufescentibus; femoribus posticis ad basin apiceque antennarum piceis; abdominis segmentis flavo irregulariter marginatis.

Long. corp. lin. $4\frac{1}{4}$. Exp. alar. lin. $6\frac{1}{4}$.

Hab. in Novâ Hollandiâ.—In Mus. Dom. Hope.

Genus **DORYLUS**, *Fabr.*

DORYLUS ORIENTALIS. *A Dor. helvolo distinguitur, staturá paullo graciliore, nervo recurrenti alarum anticarum pone medium areolæ submarginalis inserto, nervisque binis internis (posticarum) nervis duobus transversis connexis.*

Hab. in India Orientali.—In Mus. Westw. Communicavit Dom. W. W. Saunders, F.L.S.